

## **Aviso de enfermedad de tos convulsiva**

### **Aviso importante para los padres**

**8 Abril 2019**

Se ha diagnosticado tos convulsiva, también conocida como tos ferina, al menos a un estudiante que asiste a **Knapp**. La tos convulsiva es una enfermedad contagiosa que puede prevenirse mediante la vacuna triple vírica contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.

#### **SEÑALES Y SÍNTOMAS**

- La tos convulsiva empieza con síntomas similares a un resfriado: tos leve, febrícula o ausencia de fiebre.
- La tos se vuelve más grave, lo cual provoca episodios de tos.
- Estos episodios de tos pueden verse seguidos de vómitos, dificultad para respirar, amoratamiento de la cara y/o sonidos agudos
- En ocasiones, las personas parecen estar bien entre los episodios de tos

#### **¿CÓMO SE TRANSMITE?**

- La tos convulsiva se transmite cuando una persona infectada estornuda o tose y otra persona inhala las bacterias
- Tras la exposición a la tos convulsiva, una persona se enferma transcurridos de 4 a 21 días (normalmente de 7 a 10 días)

#### **¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PUEDE UNA PERSONA CONTAGIAR LA INFECCIÓN A LOS DEMÁS?**

- Una persona es más contagiosa durante las etapas iniciales de la enfermedad
- Una persona deja de ser contagiosa al cabo de cinco días tras la administración de un tratamiento adecuado con antibióticos o tras 21 días de tos

#### **TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CONTAGIO**

- Comuníquese con el médico para que evalúe a su hijo si este presenta tos.
- Informe al médico sobre la posible exposición a la tos convulsiva.
- Existe una prueba para detectar la tos convulsiva; solicite al médico que realice la prueba (RCP por muestra o lavado nasal).
- Si su hijo presenta tos convulsiva, es posible que el médico recete antibióticos.
- Si se diagnostica tos convulsiva a una persona, esta debe permanecer en su hogar hasta completar cinco días de tratamiento con antibiótico o hasta que ya no sea contagiosa, 21 días después de la aparición de la tos.
- Es posible que una persona tosa tras el tratamiento antibiótico de cinco días, pero ya no es contagiosa.
- Verifique la cartilla de vacunación de su hijo y asegúrese de que tiene la vacuna triple vírica contra la tos convulsiva (difteria, tétanos y tos ferina).
- Los familiares también deberían solicitar al médico la receta de antibióticos para evitar enfermarse (uso de antibióticos como profilaxis postexposición).

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con **Denver Public Health al 303602-3614**, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.